



Sortie du 14 juin 2026 en forêt de Villefermoy au carrefour des 8 Routes

Cette sortie de la mi-juin 2026 n'augurait rien de bon. Trop sec, trop chaud une fois de plus... Cassandra avait raison mais sans être entendue. Toutefois, le site des 8 routes, à la fois hêtraie ombreuse et marécage à Cyprès chauve fidèle à sa réputation a offert 42 espèces aux 22 mycologues AMF et SMF confiants. Une belle victoire !

Dans la hêtraie villefermoise, on retrouve les espèces ectomycorhiziennes habituelles pour la saison telles que le bolet craquelé ([*Leccinellum crocipodium*](#)), les russules dorée ([*Russula aurea*](#)) et aurore ([*Russula aurora*](#)), et le fameux lactaire poivré ([*Lactifluus piperatus*](#)), le piment des sous-



bois. René a identifié après analyse microscopique une russule faux-lactaire à petites spores ([*Russula delica* var. *puta*](#)) moins commune que l'espèce type. Appelée russule sans lait ou faux-lactaire pour son aspect trompeur, cette espèce présente des spores de seulement 6 μ et exhale une odeur de poisson pas frais en vieillissant.




Des "croûtes" et des espèces sans lames peu communes, voire rares ont été trouvées. Citons [*Hymenochaete cruenta*](#) à hyménium rouge sang qui pousse sur conifères, [*Amylokenasma allantosporum*](#), une espèce gris bleuté qui n'avait jamais été

trouvé à Villefermoy et [*Sidera vulgaris*](#) avec un remarquable hyménium labyrinthe et des spores en forme de croissant.



© René Chalange

Amylokenasma allantosporum



© René Chalange

Sidera vulgaris

Le bayou de Villefermoy quant à lui, accueille quelques Cyprès chauves (*Taxodium distichum*), conifères à aiguilles molles et caduques. Ces arbres affectionnent les berges et s'adaptent au sol inondé et anoxique en formant des racines aériennes verticales, appelés pneumatophores ou genoux, qui permettent de respirer. Le courant d'Huchet dans les Landes est un des plus remarquables bayous français à Cyprès chauve, mais sans les alligators hélas ! (photo des genoux de *Taxodium* landais ci-contre). En raison de la nature du sol, le cyprès chauve serait dépourvu d'ectomycorhizes mais pourvu uniquement d'endomycorhizes à arbuscules formées en association avec des Glomérormycètes, champignons symbiotiques donc sans carpophore. Ces informations transmises par **BahIA de Meta**, mon assistante virtuelle fraîchement recrutée sont toutefois sujettes à caution,



puisqu'elle m'a également indiqué par erreur que le Cyprès chauve était le seul conifère à feuilles caduques et que *Inonotus rickii* lui sautait sur les genoux.

Seuls Jean-Pierre et Jean-Pierre ainsi que Danièle qui ont fureté longuement sous les *Taxodium* savent quelles espèces poussent dans la

litière de leurs aiguilles. Ce mystère demeurera entier jusqu'à la prochaine excursion villefermoise.

La liste des espèces trouvées est consultable à partir de [cette page](#).

Valérie Tarrius Flesch